

БИОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ *SERRATULA CORONATA* L. (ASTERACEAE) ЗА УМОВ ІНТРОДУКЦІЇ В БОТАНІЧНОМУ САДУ ЖНАЕУ

Ірина В. Іващенко¹ та Джамаал Б. Рахметов²

Анотація. Встановлено особливості росту, розвитку та морфології рослин *Serratula coronata* L. за умов інтродукції в ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету, що належить до зони Полісся України. Наведено результати вивчення *S. coronata ex situ* за періодами онтогенезу: латентним, прегенеративним та частково генеративним. Описані ознаки шести вікових станів особин: сім'янки в стані спокою, проростки, ювенільний, іматурний, молодий (ранній) генеративний, середньовіковий (зрілий) генеративний. В перший рік життя сіянці *S. coronata* проходили прегенеративний період онтогенезу. На другий рік рослини вступали в генеративний період, досягаючи середньовікового генеративного стану на третій рік зростання. Рослини *S. coronata* формували вегетативні, генеративні органи, життєздатне насіння, що є свідченням достатнього ступеня адаптації виду до умов регіону.

Ключові слова: *Serratula coronata*, Asteraceae, інтродукція, морфологічні особливості, вікові стани, періоди онтогенезу

¹ Житомирський національний агроекологічний університет, Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008, Україна; kalateja@ukr.net

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014, Україна; jamal_r@bigmir.net

Вступ

Serratula coronata L. (серпій увінчаний) – багаторічна трав'яна рослина з родини Asteraceae, триби Cynareae Less. (Віслюїна 1965). Поширений цей вид у Середній Азії, Східній Європі, Східному і Західному Сибіру, Кавказі та на Далекому Сході (Соколов 1993; Черепанов 1995). В Україні вид представлений в південній частині Полісся, в Лісостепу, за винятком крайнього заходу, північній частині Степу (Віслюїна 1965; Доброчаєва *и др.* 1987), де рослини зростають розсіяно на сухих луках, по узліссях і в степових чагарниках.

В Україні в культурі серпій увінчаний не вирощують. В народній медицині він використовується при епілепсії, неврозах, новоутвореннях, анемії, геморої, ангіні, блювоті, пропасниці, в якості ранозагоювального засобу (Соколов 1993). Надземна частина

S. coronata містить флавоноїди, сліди алкалоїдів та аскорбінову кислоту (Мінарченко 2005). Амінокислотний склад листків характеризується високим вмістом аспарагінової і глутамінової кислот, а також лейцину, а в бутонах відмічена висока концентрація L-аргініну (Володин 2003). Із *S. coronata*, вирощеної на території України, виділено фітоекдистероїди: 20-гідроксiekдизон (екдистерон), екдизон, поліподин В, інтегристерон А, птеростерон, 20,22-моноацетонід екдистерону і 2,3,20,22-діацетонід екдистерону (Холодова 1979). Фітоекдистероїди являють собою велику групу полігідроксильованих стероїдів, які виявляють анаболічну, адаптогенну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу, гепато-, нейро- та нефропротекторну, антиаритмічну, імуномодулюючу, гіпоглікемічну і гіпохолестеролемічну властивості, а також характеризуються низькою токсичністю (Володин 2003).

Актуальним є пошук нових природних джерел фітоекдистероїдів для використання в якості адаптогенних лікарських препаратів, що в значній мірі відновлюють і підвищують працездатність при розумових і фізичних перевтомах (Пчеленко 2002). В надземній частині *S. coronata* сумарний вміст екдистероїдів, залежно від фази вегетації, складає від 0,5% до 1,5%, що на порядок вище, ніж у рапонтікума сафлоровидного (Новосельская и др. 1998).

Застосування серпію увінчаного у фармації як природного джерела фітоекдистероїдів є перспективним та потребує подальшого ретельного вивчення біоморфологічних особливостей і життєвого циклу рослини в умовах культури. Водночас, для умов Житомирського Полісся відсутні відомості щодо введення даного виду рослин в культуру. Тому метою цієї роботи було вивчення онтогенезу, морфо-біологічних особливостей рослин *S. coronata* за інтродукції в ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету.

Матеріали і методи досліджень

Предметом досліджень були рослини *S. coronata*. Для оцінки адаптивних можливостей нового інтродуцента ми вивчали біоморфологічні особливості розвитку рослин в ботанічному саду ЖНАЕУ. У дослідженнях використовували вихідний матеріал із колекції рослин відділу нових культур Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Особливості росту і розвитку рослин вивчали упродовж 2013-2015 рр. згідно із загальноприйнятими методиками (Работнов 1950; Уранов и Смирнова 1969; Серебрякова 1972; Бейдеман 1974; Жукова 2013); якісні показники насіння оцінювали згідно з ДСТУ 7160 – 2010. В описах використано загальноприйнята термінологію з морфології вищих рослин (Артюшенко і Федоров 1986; Новіков і Барабаш-Красни 2015).

Для мікроскопічних досліджень використовували Біолам-70, BB5 з USB

камерою та USB цифровий мікроскопи. Фотофіксацію результатів здійснювали за допомогою цифрової фотокамер Canon DC 8.1 V та Levenhuk D 50 L NG.

Біометричні й загальні морфологічні дослідження проводили, розпочинаючи з латентного періоду.

Результати та їх обговорення

S. coronata – багаторічна полікарпічна, симподіальна, з напіврозетковим типом структури надземних пагонів трав'яна рослина (Комаров 1963). Є гемікриптофітом (Харина и Швыдкая 1993), кореневище потужне, горизонтальне, з багаточисленними шнуроподібними коренями. Стебла прямостоячі, високі (до 200 см заввишки), розгалужені, багатогранні й ребристо-борозенчасті; листки від пірчасто-роздільних до розсічених, з 3-7 парами яйцеподібно-або довгасто-ланцетних бічних сегментів. Кошики на кінцях головних пагонів по 1-2, крайові квітки функціонально маточкові, серединні – двостатеві; плід – сім'янка з чубком (Вісюліна 1965). За класифікацією життєвих форм І.Г. Серебрякова *S. coronata* відноситься до трав'янистих чубчатокореневих (китицекореневих або додатковокореневих) полікарпиків (Серебряков 1964; Бек 2009).

Біоморфологічні особливості рослин *S. coronata* висвітлені для кожного із періодів онтогенезу відповідно до конкретного вікового стану. На підставі біоморфологічного аналізу різновікових рослин *S. coronata* описано 6 вікових станів особин і досліджено латентний, прегенеративний та частково генеративний періоди онтоморфогенезу.

Латентний період. Плід *S. coronata* – сім'янка з чубком (папкусом), коричнювато-світло-бурого кольору, довгасто-клиноподібної форми, з тонкими поздовжніми реберцями, завдовжки $7,13 \pm 0,46$ мм і завширшки $2,33 \pm 0,21$ мм; папкус – $9,22 \pm 0,86$ мм завдовжки, з рудих зазублених щетинок (Рис. 3 Ж). За типом поширення *S. coronata* – анемохор. Маса 1000 сім'янок становить $3,28 \pm 0,12$ г. Свіжозібране




Рис. 1. Прегенеративний період онтогенезу *Serratula coronata*: **p** – проростки; **j₁-j₄** – ювенільні рослини; **im₁-im₂** – іматурні рослини.

Fig. 1. Pregenerative period of ontogenesis of *Serratula coronata*: **p** – sprouts; **j₁-j₄** – juvenile plants; **im₁-im₂** – immature plants.



Рис. 2. Сіянци *Serratula coronata*: **А** – другого року життя у генеративний період; **Б-Г** – третього року життя у фазах весняного відростання, вегетативній і бутонізації відповідно.

Fig. 2. *Serratula coronata* seedlings: **A** – second year of life in the generative period; **Б-Г** – third year of life in the phases of spring growth, vegetative, and budding respectively.



Рис. 2. Сіянци *Serratula coronata*. Продовження: Д-Е – третього року життя у фазах цвітіння і плодоношення відповідно.

Fig. 2. *Serratula coronata* seedlings. Continued: Д-Е – third year of life in the phases of blossoming and fruit-bearing respectively.

насіння має низьку схожість і енергію проростання, потребує стратифікації. Згідно з дослідженнями С.А. Бек (2009), свіжозібраному насінню серпію увінчаного достатньо 10 діб зберігання при температурі 5-7 °С для суттєвого підвищення схожості. Через 6 місяців після збирання урожаю лабораторна схожість стратифікованого насіння становила 83%, а енергія проростання – 66%.

Прегенеративний період. Триває від проростання насіння до початку цвітіння; включає наступні вікові стани: проростки, ювенільний, іматурний, віргінійний.

Проростки (р). Весняні посіви серпію увінчаного проводились стратифікованим насінням у третій декаді квітня. Поодинокі сходи спостерігались через 7-10 діб, масові

через 12-16 діб після посіву, залежно від метеорологічних умов. Для серпію увінчаного характерний надземний тип проростання. Насіннева шкірка звичайно залишається в ґрунті, дуже рідко виноситься на поверхню. Сім'ядольні листки цілюнокраї, овальної форми, світло-зелені, завдовжки $9,05 \pm 0,25$ мм, завширшки $2,24 \pm 0,11$ мм (Рис. 1: р). Світло-коричневий корінець завдовжки $30,0 \pm 0,8$ мм, не має бічних коренів і значно перевищує гіпокотиль, довжина якого становить $6,95 \pm 0,27$ мм. У більшості проростків гіпокотиль світло-зеленого кольору, іноді має темно-бордове забарвлення. Ріст сім'ядольних листків завершується до моменту розгортання першого справжнього листка – на 11-13 добу. В цей період довжина сім'ядольних листків складає в середньому 25 мм, ширина – 8 мм;




Рис. 3. Морфологічні особливості органів рослин *Serratula coronata*: **А** – суцвіття; **Б** – бутон ($\times 20$); **В** – двостатева квітка ($\times 20$); Γ_1 - Γ_3 – фрагменти віночка двостатевої квітки ($\times 20$); Δ_1 - Δ_2 – фрагменти віночка одностатевої квітки ($\times 20$); **Е** – приймочка ($\times 20$); **Є** – папіус ($\times 20$).

Fig. 3. Morphological features of plants' organs of *Serratula coronata*: **A** – inflorescence; **B** – bud ($\times 20$); **B** – bisexual flower ($\times 20$); Γ_1 - Γ_3 – fragments of the corolla of the bisexual flower ($\times 20$); Δ_1 - Δ_2 – fragments of the corolla of the unisexual flower ($\times 20$); **E** – stigma ($\times 20$); **Є** – pappus ($\times 20$).

корінь є завдовжки 40 мм, гіпокотиль – 20 мм. Проростки швидко переходять у ювенільний віковий стан.

Ювенільні рослини (j). У ювенільному стані у рослин серпю увінчаного розвиваються перші справжні листки (Рис. 1: j_1 - j_4). Перший ювенільний листок яйцеподібної форми, із зубчастим краєм

листової пластинки, темно-зеленого кольору, завдовжки $37,7 \pm 3,5$ мм, завширшки $24,6 \pm 1,8$ мм. Центральні і бічні жилки добре виражені. Черешок зазвичай червонувато-коричневого кольору. Головний корінь стрижневий, завдовжки $39,6 \pm 2,7$ мм, на ньому спостерігається галузнення та розвиток від 4 до 8 бічних коренів. Другий справжній листок



Рис. 3. Морфологічні особливості органів рослин *Serratula coronata*. Продовження: Ж – сім'янка ($\times 20$); З₁-З₂ – листок; И – коренева система.

Fig. 3. Morphological features of plants' organs of *Serratula coronata*. Continued: Ж – achene ($\times 20$); З₁-З₂ – leaf; И – root system.

формується через 22-25 діб після появи проростків. Він також яйцеподібної форми і з зубчастим краєм. Інтервал між формуванням листової пластинки другого і третього справжнього листків складає 12-14 діб. До цього періоду у більшості сіянців починають засихати сім'ядольні листки. Сьомі та восьмі розеткові листки зазвичай трійчаторозсічені завдовжки 15-18 см, завширшки 7-9 см. Висота рослин в ювенільному періоді становила $21,01 \pm 1,25$ см. Коренева система досягала $10,97 \pm 0,92$ см завдовжки, формувались додаткові корені.

Іматурні рослини (ім). У сіянців серпню увінчаного спостерігалися подальші морфологічні зміни підземних і надземних органів (Рис. 1: ім₁, ім₂). Розвиток кореня супроводжувався зростанням його довжини до $20,39 \pm 0,93$ см, кількості додаткових коренів до 4-6. Особливо помітна зміна форми листка

– формується пірчаторозсічена листовка пластинка із п'яти сегментів, завдовжки $18,97 \pm 1,27$ см і завширшки $9,22 \pm 0,66$ см. Наступні розеткові листки за формою відрізнялись від листків генеративних рослин тільки меншою кількістю сегментів. Нові пірчаторозсічені листки в розетці сіянців з'являлись з інтервалом 7-10 діб до кінця вегетативного періоду. Більшість сіянців до кінця вегетації мали не більше 12-14 листків в розетці. Висота рослин становила $28 \pm 2,16$ см. Сіянці закінчували вегетацію в іматурному віковому стані (Рис. 1: ім₂).

Упродовж першого року життя сіянці ростуть повільно, особливо протягом першого місяця після появи сходів, характеризуються низькою посухостійкістю.

Віргінільні рослини (v). Віргінільні рослини *S. coronata* представлені укороченими вегетативними пагонами із

пірчаторозсіченими листками (Бек 2009). За роки досліджень в умовах Житомирського Полісся у віргінільний віковий стан рослини не вступали. Випадіння віргінільного вікового стану було відмічене також іншими дослідниками за умов інтродукції *S. coronata* в сухостеповій зоні центрального Казахстану (Бек 2009).

Генеративний період. З настанням фази цвітіння і плодоношення на другому році життя особини вступають у генеративний період розвитку. Надалі рослини щорічно проходять малий цикл розвитку, досягаючи на третій рік життя стану середньовікових генеративних особин. В умовах інтродукції генеративний період у особин *S. coronata* значно перевищує прегенеративний.

Молоді генеративні особини (g1). Молоді генеративні рослини характеризувались подальшим формуванням дорослих структур: генеративних пагонів із суцвіттями та мичкуватою кореневою системою.

У сіянців другого року життя фаза весняного відростання наступала в третій декаді березня, бутонізація – в першій декаді червня, цвітіння – у другій декаді липня, плодоношення – в першій декаді серпня. Насіння достигало у третій декаді серпня – першій декаді вересня. У молодих генеративних особин формувалось по 1-3 генеративних пагони висотою $81,44 \pm 8,96$ см, діаметром $6,84 \pm 0,38$ мм біля основи; на основному пагоні зазвичай містилося $3,5 \pm 1,01$ бічних. В прикореневій розетці утворювалось $6 \pm 0,39$ листків (Рис. 2 А). Листки непарнопірчасті, від роздільних до розсічених, з 4-7 парами продовгасто-ланцетних бічних сегментів і більшим за них верхівковим сегментом. Листки зверху голі, темно-зелені або з пурпуроватим відтінком, зісподу світліші. Сегменти листків гострокінчикові, по всьому краю пильчасті (Рис. 3: $3_1, 3_2$). На адаксіальній та абаксіальній поверхнях є трихоми (Рис. 4 А-Г). Розеткові листки довгочерешкові, великі; стеблові листки серединної формації короткочерешкові, верхівкові – сидячі. Пластинки листків серединної формації

завдовжки $16,03 \pm 0,54$ см, завширшки $11,03 \pm 0,53$ см. Листкорозміщення почергове. Стебла прямостоячі, розгалужені, багатогранні, пурпурові. На одній рослині формується $10,8 \pm 2,38$ суцвіть, що розміщуються на головних та бічних пагонах по одному, або скупчені по два або три (Рис. 3 А). В середньому довжина кошика становила $3,02 \pm 0,20$ см. Обгортка кошика довгасто-яйцеподібна, $17,97 \pm 1,33$ мм у діаметрі, коричневатопурпурова, повстяно-шерстиста з черепитчасто розміщеними листочками. Зовнішні листочки коротші, ширші, гострокінчикові, ланцетоподібні; внутрішні – довші, лінійчаті. Квітки трубчасті, лілово-пурпурові. Крайові квітки функціонально маточкові, з 3-4 стерильними тичинками та, іноді, з три- або чотирироздільним відгином віночка, нечисленні, завдовжки $28,73 \pm 0,55$ мм. Середні квітки двостатеві, з п'ятироздільним відгином, численні, завдовжки $19,76 \pm 0,52$ мм. (Рис. 3 Б-Є). Віночок одностатевих квіток збільшений та вузкий (Рис. 3: Γ_1 - Γ_3 , Δ_1 - Δ_2). Лопаті приймочки розведені і при досягнанні відігнуті назовні (Рис. 3 Е). В середньому один кошик містить $81,7 \pm 11,52$ квіток. Цвітіння розпочинається з верхівкового кошика (базипетальне).

З другого року життя рослини формують мичкувату кореневу систему: головний корінь повністю відмирає, розвивається кореневище з додатковими коренями. Глибина проникнення кореневої системи в ґрунт до кінця другого року життя досягає 20-25 см. Кількість додаткових коренів значно збільшується у порівнянні з першим роком і становить 20-25 шт. Бруньки відновлення знаходяться на глибині 3-4 см.

Відмирання генеративних пагонів розпочинається у фазу плодоношення і закінчується в другій або третій декадах вересня. Період від масового відростання до відмирання надземної частини рослин залежно від метеорологічних умов вегетаційного періоду становить 160-180 діб.

Середньовікові генеративні особини (g2). У цей стан рослини *S. coronata*



Рис. 4. Трихоми на абаксальній (А-Б) та адаксіальній (Г) поверхнях листової пластинки *Serratula coronata* ($\times 128$).

Fig. 4. Trichomes on the abaxial (А-Б) and adaxial (Г) leaf surfaces of *Serratula coronata* ($\times 128$).

вступали на третій рік життя (Рис. 2 Б-Е). За літературними даними він є найтриваліший. Так, в умовах середньотайгової підзони Республіки Комі та сухостепової зони Центрального Казахстану до середньовікових генеративних особин відносили рослини 3-9 років життя (Мишуров и др. 1995).

В умовах півдня Томської області вже у п'ятилітніх рослин процеси відмирання переважали над процесами росту, що свідчить про старогенеративний віковий стан (Харина 1990).

У сіянців третього року життя фаза весняного відростання наступала з третьою

декади березня, бутонізація – першої декади червня, цвітіння – першої декади липня, плодоношення – першої декади серпня. Насіння досягає в третій декаді серпня.

Упродовж інтродукційних досліджень максимальні показники висоти, кількості генеративних пагонів, маси рослин спостерігалися на третій рік життя. У фазі масового цвітіння рослини досягали $136,6 \pm 7,28$ см висоти, маса особини становила $508 \pm 27,77$ г. Пагоноутворююча здатність у рослин *S. coronata* з віком збільшувалась, і на третій рік формувалось $6 \pm 0,68$ генеративних пагонів та $83 \pm 7,36$ суцвіть на одній особині. Зростала також кількість бічних пагонів до $9,4 \pm 1,47$. Формувалась більш потужна коренева система. Укорочене кореневище досягало 7-10 см завдовжки; значно зростала кількість додаткових коренів до 50-60, глибина їх проникнення в ґрунт сягала 30-35 см (Рис. 3 И). За кількістю сегментів, розмірами листової пластинки, середньовікові генеративні особини не відрізнялись від молодих генеративних, проте кількість листків в прикореневій розетці збільшилась майже вдвічі.

Тривалість середньовікового генеративного стану в умовах Житомирського Полісся за період інтродукційних досліджень не встановлена.

Висновки

В період досліджень (2013-2015 рр.) встановлено, що за інтродукції в ботанічному саду Житомирського агроекологічного університету для великого життєвого циклу *S. coronata* властиво три періоди розвитку (латентний, прегенеративний і генеративний) та 6 вікових станів (сім'янки в стані спокою, проростки, ювенільні рослини, іматурні рослини, молоді генеративні рослини, середньовікові генеративні рослини). В перший рік життя сіянці серпію увінчаного проходили прегенеративний період онтогенезу. На другий рік вегетації рослини вступали в генеративний період, досягаючи середньовікового генеративного стану на третій рік. Рослини *S. coronata*

формували як вегетативні, так і генеративні органи, а також життєздатне насіння, що є свідченням достатнього ступеня адаптації виду до умов регіону.

Використані джерела

- АРТЮШЕНКО З.Т., ФЕДОРОВ А.А. 1986.** Атлас по описательной морфологии высших растений. Плод. Наука, Лен. отд., Ленинград.
[Artyushenko Z.T., Fedorov A.A. 1986. Atlas of descriptive morphology of higher plants. Fruit. Science, Leningrad dept., Leningrad. (In Russian)]
- БЕЙДЕМАН И.Н. 1974.** Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Наука, Новосибирск.
[Beydeman I.N. 1974. The methods of study of the phenology of plants and plant communities. Science, Novosibirsk. (In Russian)]
- БЕК С.А. 2009.** Биологические особенности *Serratula coronata* L. и ее интродукция в сухостепной зоне центрального Казахстана. Дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Томск.
[Bek S.A. 2009. Biological features of *Serratula coronata* L. and its introduction in dry-steppe zone of Central Kazakhstan. PhD thesis. Tomsk. (In Russian)]
- ВИСЮЛИНА О.Д. (ред.) 1965.** Флора УРСР. Т. XII. Вид-во АН УРСР, Київ.
[Visjulina O.D. (ed.) 1965. Flora of URSR. Vol. XII. Publ. of AS of URSR, Kyiv. (In Ukrainian)]
- ВОЛОДИН В.В. (ред.) 2003.** Фитоэкдистероиды. Наука, Санкт-Петербург.
[Volodin V.V. (ed.) 2003. Phytoecdisteroids. Science, Saint-Petersburg. (In Russian)]
- ДОБРОЧАЕВА Д.Н., КОТОВ М.И., ПРОКУДИН Ю.Н. и др. 1987.** Определитель высших растений Украины. Наук. думка, Киев.
[Dobrochaeva D.N., Kotov M.I., Prokudin Yu.N. et al. 1987. Identification key for higher plants of Ukraine. Naukova Dumka, Kyiv. (In Russian)]
- ДСТУ 7160 – 2010.** Насіння овочевих, баштаних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні умови. Технічні умови. (Чинний від 2010-07-01). Держспоживстандарт України (Національний стандарт України), Київ.
[SSTU 7160 – 2010. Seeds of vegetables, melons, fodder and aromatic plants. Varieties and crop conditions. Technical specifications. (Effective as of 2010-07-01). Derzhspozhyvchstandart Ukrainy (National standart of Ukraine), Kyiv. (In Ukrainian)]
- ЖУКОВА Л.А. 2013.** Онтогенетический атлас растений. Т. VII. Марийский гос. ун-тет, Йошкар-Ола.
[Zhukova L.A. 2013. Ontogenetical atlas of plants. Vol. VII. Mari State University, Yoshkar-Ola. (In Russian)]

- КОМАРОВ В.А. (ред.) 1963.** Флора СССР. Т. XXVIII. Изд-во АН СССР, Москва – Ленинград.
- [Komarov V.L. (ed.) 1963. Flora of USSR. Vol. XXVIII. Publ. of AS of USSR, Moscow – Leningrad. (In Russian)]
- МІНАРЧЕНКО В.М. 2005.** Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). Фітосоціоцентр, Київ.
- [Minarchenko V.M. 2005. Medical vascular plants of Ukraine (medicinal and resource values). Phytosociocenter, Kyiv. (In Ukrainian)]
- МИШУРОВ В.П., ПОРТНЯГИНА Н.В., РУБАН Г.А. 1995.** Интродукция серпухи венценосной на Севере. В сб.: Интродукция растений на европейском Северо-Востоке: 91–100. Сыктывкар.
- [Mishurov V.P., Portniagina N.V., Ruban G.A. 1995. Introduction of plumeless saw-wort on North. In: Introduction of plants on european North-East : 91–100. Syktyvkar. (In Russian)]
- НОВИКОВ А., БАРАБАШ-КРАСНИ Б. 2015.** Сучасна систематика рослин. Загальні питання: навчальний посібник. Ліга-Прес, Львів.
- [Novikov A., Barabasz-Krasny B. 2015. Modern plant systematics. General issues. Liga-Press, Lviv. (In Ukrainian)]
- НОВОСЕЛЬСКАЯ И.А., ГОРОВИЦ М.Б., АБУБАКИРОВ Н.К. 1998.** Фитоэкдистероиды *Serratula coronata*. Химия природных соединений 5: 668–669.
- [Novoselskaya I.L., Gorovits M.B., Abubakirov N.K. 1998. Phytoecdisteroids of *Serratula coronata*. Chemistry of Natural Compounds 5: 668–669. (In Russian)]
- ПЧЕЛЕНКО Л.Д. 2002.** Адаптогенный эффект экдистероидов серпухи венценосной. Вестник Ин-та биологии Коми НЦ УрОРАН 1: 2–4.
- [Pchelenko L.D. 2002. Adaptogenic effect of ecdisteroids of plumeless saw-wort. News Inst. Biol. Sci. Center UrORAN 1: 2–4. (In Russian)]
- РАБОТНОВ Т.А. 1950.** Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах. Труды Ботанического ин-та АН СССР 3 (6): 7–204.
- [Rabotnov T.A. 1950. Life cycle of perennial herbaceous plants in the meadow coenoses. Works of Botanical Institute of AS USSR 3 (6): 7–204. (In Russian)]
- СЕРЕБРЯКОВ И.Г. 1964.** Жизненные формы высших растений и их изучение. В кн.: Корчагин А.А., Лавренко Е.М. (ред.), Полевая геоботаника. Наука, Москва – Ленинград.
- [Serebriakov I.G. 1964. Life forms of higher plants and their research. In: Korchagin A.A., Lavrenko E.M. (eds), Field geobotany. Science, Moscow – Leningrad. (In Russian)]
- СЕРЕБРЯКОВА Т.И. 1972.** Учение о жизненных формах растений на современном этапе. Итоги науки и техники. Серия Ботаника 1: 84–169.
- [Serebriakova T.I. 1972. The study about life forms of the plants on current stage. The results of science and technology. Ser. Botany 1: 84–169. (In Russian)]
- СОКОЛОВ П.Д. (ред.) 1993.** Растительные ресурсы СССР: цветковые растения, их химический состав, использование. Семейство Asteraceae. Наука, Санкт-Петербург.
- [Sokolov P.D. (ed.) 1993. Plant resources of USSR: Flowering plants, their chemical composition, and application. Family Asteraceae. Science, Saint-Petersburg. (In Russian)]
- УРАНОВ А.А., СМЕРНОВА О.В. 1969.** Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений. Бюлл. МОИП. Отд. биол. 79 (1): 19–135.
- [Uranov A.A., Smirnova O.V. 1969. Classification and general characters of the development of populations of perennial plants. Bull. MOIP. Otd. Biol. 79 (1): 19–135. (In Russian)]
- ХАРИНА Т.Г. 1990.** Эколого-биологические особенности серпухи венценосной в связи с интродукцией в Западной Сибири: автореф. дис... канд. биол. наук. Новосибирск.
- [Kharina T.G. 1990. Eco-biological peculiarities of plumeless saw-wort in relation with introduction in Western Siberia. Proc. of PhD thesis. Novosibirsk. (In Russian)]
- ХАРИНА Т.Г., ШВЫДКАЯ Н.В. 1993.** Онтогенетический аспект в изучении лекарственных растений в целях интродукции. Экологические проблемы интродукции растений на современном этапе: Вопросы теории и практики (тезисы докл. Междунар. науч. конф., Краснодар, 1993). Ч. 1: 427–430. Краснодар.
- [Kharina T.G., Shvydkaya N.V. 1993. Ontogenetical aspect in study of medical plants with a purpose of introduction. Ecological problems of introduction of the plants on current stage: The questions of theory and practice (Proc. of Internat. Sci. Conf, Krasnodar, 1993). Part 1: 427–430. (In Russian)]
- ХОЛОДОВА Ю.Д. 1979.** Фитоэкдизоны – биологически активные полигидроксифицированные стеринны. Укр. биохим. журн. 51 (5): 560–575.
- [Kholodova Yu.D. 1979. Phytoecdizones - bioactive polihydroxylated sterins. Ukr. Biochem. J. 51 (5): 560–575. (In Russian)]
- ЧЕРЕПАНОВ С.К. 1995.** Сосудистые растения России и сопредельных государств. Мир и семья – 95, Санкт-Петербург.
- [Cherepanov S.K. 1995. Vascular plants of Russia and adjacent countries. Mir i semia – 95, Saint-Petersburg. (In Russian)]

BIOMORPHOLOGICAL FEATURES OF *SERRATULA CORONATA* L. (ASTERACEAE) INTRODUCED IN ZHNAEU' S BOTANICAL GARDENIRYNA V. IVASHCHENKO ¹ & DZAMAL B. RAKHMETOV ²

Abstract. Peculiarities of growth, evolution and morphology of *Serratula coronata* L. were determined under introduction in conditions of Botanical Garden of Zhytomyr National Agroecological University that belongs to Polissya region of Ukraine. The results of investigation of *S. coronata ex situ* are presented for the next periods of ontogenesis: latent, pregenerative and partly generative. The features of the 6 age states of individuals are specified: achen dormant, sprouts, juvenile, immature, young generative, middle-aged generative. During the first year of life the seeds of *S. coronata* were passing the pregenerative period of ontogenesis. In the second year the plants got into generative period achieving middle-aged generative state in the third year of growth. Plants of *S. coronata* formed vegetative and generative organs, as well as viable seeds and that confirms sufficient species adaptation in conditions of the described region.

Key words: *Serratula coronata*, Asteraceae, introduction, morphological peculiarities, age states, periods of ontogenesis

¹ Zhytomyr National Agroecological University, Stary Boulevard 7, 10008 Zhytomyr, Ukraine; kalateja@ukr.net

² M.M. Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine, Timiryazivska str. 1, 01014 Kyiv, Ukraine; jamal_r@bigmir.net